

Gentile Utente,

per il buon fine delle indagini alle quali verrà sottoposto, La preghiamo volersi attenere scrupolosamente alle istruzioni di seguito elencate:

La Direzione

PREPARAZIONE

Eeguire preventivamente i seguenti esami ematochimici:

- Creatinina con eGFR (filtrazione glomerulare)

n.b. gli esami non devono avere una data superiore a 15 gg

È indispensabile il digiuno di almeno sei ore

Gli utenti portatori di Pace Macker e/o valvola cardiaca o altro tipo di protesi, devono presentare una documentazione (cartella clinica) che attesti la compatibilità della protesi con l'esame da effettuare.

Per utenti allergici eseguire terapia desensibilizzante nei **tre giorni** precedenti l'esame:

- ZIRTEC compr., 1 compr. dopo pranzo e 1 dopo cena;

- DELTACORTENE 25MG 2 compr. la sera prima dell'esame e 1 compr. la mattina dell'esame

- ZANTAC 150 mg compr., 1 compr. alla mattina e 1 alla sera

Prima di iniziare la terapia consultare sempre il proprio medico curante.

¹ Linee-guida internazionali emanate da gruppi di esperti di società scientifiche della radiologia (SIRM) e della nefrologia (ESUR)